



SCAN ME

Plus d'informations sur les vaccins sur
selondonics.org/childrenshealth

Produit par NHS South East London, août 2023

French



South East London

A group of diverse children in school uniforms are running happily down a school hallway. They are carrying backpacks and looking towards the camera with joyful expressions. The hallway has brick walls and large windows.

**Protéger la santé des enfants
maintenant et pour l'avenir**

À quel âge mon enfant doit-il recevoir ses vaccinations de routine ?



8 semaines

- Vaccin 6 en 1 (1ère dose)
- Vaccin anti-rotavirus (1ère dose)
- Men-B (1ère dose)



12 semaines

- Vaccin 6 en 1 (2ème dose)
- Vaccin anti-rotavirus (2ème dose)
- Vaccin anti-pneumococcique (VPC)



16 semaines

- Vaccin 6 en 1 (2ème dose)
- Men-B (2ème dose)



1 an

- Hib/Men-C
- ROR (1ère dose)
- Vaccin anti-pneumococcique (VPC) (2ème dose)
- Men-B (3ème dose)



18 mois

- ROR (2ème dose) pour les enfants vivant dans la plupart des quartiers du sud-est de Londres



2 à 16 ans

- Vaccin anti-grippal (Tous les ans)



3 ans et 4 mois

- 4 en 1 (Rappel préalable à l'école)



12 à 13 ans

- Vaccin contre les papillomavirus (anti-VPH)



14 ans

- 3 en 1 (Rappel de l'adolescence)
- Méningocoques ACWY