


افزایش موارد ابتلا به سرخک در جنوب لندن

در حال و آینده، از کودک خود در
برابر سرخک محافظت کنید



اسکن کنید

اطلاعات بیشتر:

www.nhs.uk/measles

سرخک به راحتی شیوع پیدا می کند. واکسن MMR (سرخک، اوریون و سرخجه) نهایت ایمنی را فراهم می آورد.

علائم سرخک

سرخک معمولاً با علائمی شبیه سرماخوردگی شروع و سپس بثوراتی روی پوست ظاهر می شود. برخی افراد نیز ممکن است لکه های کوچکی در دهان خود پیدا کنند. این بیماری گاهی می تواند منجر به عوارض جدی مانند کوری، ذات الریه، مننژیت و سپسیس شود که خطر جانی دارد.

هیچ ارتباطی بین واکسن MMR و اوتیسم وجود ندارد. تحقیقات بسیاری این موضوع را ثابت کرده اند.

آیا واکسن MMR عوارض جانبی دارد؟

واکسن MMR نیز مانند سایر داروها ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند. اکثر عوارض جانبی خفیف هستند، مانند احساس درد در بازوی تزریق شده یا احساس ناخوشی و تب در کودک به مدت چند روز.


شواهد نشان می دهد که واکسن زدن بسیار ایمن تر از واکسن نزدن است.

آیا واکسن MMR حاوی ژلاتین (از خوک) است؟

در بریتانیا، دو واکسن MMR داریم که بسیار اثرگذار هستند. یکی از آنها حاوی ژلاتین خوک است و دیگری نه. اگر می خواهید واکسن بدون ژلاتین بزنید، لطفاً هنگام رزرو نوبت به پزشک عمومی خود اطلاع دهید.

از کجا می توانم برای خودم یا فرزندم واکسن دریافت کنم؟

برای رزرو نوبت، با مطب پزشک عمومی خود تماس بگیرید. همچنین، در کلینیک های زیر می توانید واکسن دریافت کنید:



نمونه ای از بثورات سرخک

برای اطلاعات بیشتر درباره علائم سرخک و اقدامات لازم در صورت ابتلای خود یا فرزندتان به این بیماری، به این نشانی مراجعه کنید:

www.nhs.uk/measles

چه زمانی باید فرزندم را واکسینه کنم؟

واکسن MMR بخشی از برنامه روتین واکسیناسیون کودکان NHS است که دوز اول آن در یک سالگی و دوز دوم در 18 ماهگی تزریق می شود.

برای ایمنی کامل، دو دوز واکسن MMR مورد نیاز است. هیچ وقت برای دریافت این واکسن دیر نیست.

آیا واکسن MMR بی خطر است؟

واکسن MMR بی خطر است و از اوایل دهه 1980 مورد استفاده قرار گرفته است.

