



SCAN ME

Więcej informacji o szczepieniach

selondonics.org/childrenshealth

Przygotowane przez NHS South East London, sierpień 2023 r.

Polish

NHS

South East London

A group of diverse children in school uniforms are running happily through a school hallway. They are carrying backpacks and looking towards the camera with joyful expressions. The hallway has brick walls and large windows.

Ochrona zdrowia dzieci
teraz i w przyszłości

W jakim wieku dziecko powinno otrzymać rutynowe szczepienia?



8 tygodni

- Szczepionka 6 w 1 (1. dawka)
- Szczepionka przeciwko rotawirusom (1. dawka)
- Meningokoki grupy B (1. dawka)



12 tygodni

- Szczepionka 6 w 1 (2. dawka)
- Szczepionka przeciwko rotawirusom (2. dawka)
- Szczepionka przeciwko pneumokokom (PCV)



16 tygodni

- Szczepionka 6 w 1 (3. dawka)
- Meningokoki grupy B (2. dawka)



1 rok

- Hib/Meningokoki grupy C
- MMR (świnka, odra, różyczka) (1. dawka)
- Pneumokoki (PCV) (2. dawka)
- Meningokoki grupy B (3. dawka)



18 miesięcy

- MMR (świnka, odra, różyczka) (2. dawka) dla dzieci mieszkających w większości dzielnic południowo-wschodniego Londynu



2-16 lat

- Szczepionka przeciw grypie (raz w roku)



3 lata i 4 miesiące

- 4 w 1 (dawka przypominająca dla dzieci w wieku przedszkolnym)



12-13 lat

- Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)



14 lat

- 3 w 1 (dawka przypominająca dla dzieci w wieku nastoletnim)
- Meningokoki grupy A, C, W, Y