



SCAN ME

Mais informações acerca das vacinas

selondonics.org/childrenshealth

Realizado pelo NHS South East London, agosto de 2023

Portuguese



South East London

A proteger a saúde das crianças
no presente e no futuro

A partir de que idade é que as crianças precisam de levar as vacinas de rotina?



8 semanas

- 6 em 1 Vacina (1ª dose)
- Vacina contra o Rotavírus (1ª dose)
- Meningite B (1ª dose)



12 semanas

- Vacina 6 em 1 (2ª dose)
- Vacina contra o Rotavírus (2ª dose)
- Vacina Pneumocócica(PCV)



16 semanas

- Vacina 6 em 1 (3ª dose)
- Meningite B (2ª dose)



1 ano

- Hib/MenC
- Vacina contra o sarampo, papeira e rubéola (1ª Dose)
- Vacina Pneumocócica (PCV) (2ª Dose)
- Meningite B (3ª dose)



18 meses

- Vacina contra o sarampo, papeira e rubéola (2ª dose) para crianças que vivem maioritariamente nos bairros da zona sudeste de Londres



2 - 16 anos

- Vacina contra a gripe (todos os anos)



3 anos e 4 meses

- 4 em 1 (reforço pré-escolar)



12-13 anos

- Vacina contra o HPV



14 anos

- 3 em 1 (reforço para adolescentes)
- MenACWY